SOLOS

CENTRO DO ESTADO DE RORAIMA

UM	Descrição	Área (ha)	%
	AFLORAMENTO DE ROCHA	**14.714,2**	**0,36%**
AR	AFLORAMENTOS DE ROCHAS suave ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico arenoso A moderado plano + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico arenoso A moderado plano + GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico	14.714,2	0,36%
	ARGISSOLO	**1.273.711,8**	**30,76%**
	ARGISSOLO ACINZENTADO	**3.118,1**	**0,08%**
	ARGISSOLO ACINZENTADO Distrófico	3.118,1	0,08%
PAd4	ARGISSOLO ACINZENTADO Distrófico típico, textura arenosa pouco cascalhento/média pouco cascalhento A fraco, cerrado e relevo plano	3.118,1	0,08%
	ARGISSOLO AMARELO	**504.815,3**	**12,19%**
	ARGISSOLO AMARELO Alítico	1.159,7	0,03%
PAal	ARGISSOLO AMARELO Alítico plíntico, textura arenosa/média A moderado. Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano	1.159,7	0,03%
	ARGISSOLO AMARELO Distrófico	503.655,6	12,16%
PAd1	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico, textura arenosa/média A moderado. Cerrado e Floresta Equatorial subperenifólia e relevo suave ondulado	3.614,7	0,09%
PAd2	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa pouco cascalhento/média cascalhento A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano	3.411,0	0,08%
PAd3	ARGISSOLO AMARELO Distrófico plíntico textura média/argilosa + LATOSSOLO AMARELO Distrófico plíntico textura muito argilosa, ondulado ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano	1.191,5	0,03%
PAd4	ARGISSOLO AMARELO Distrófico plíntico textura arenosa/média + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa e textura média muito cascalhenta/argilosa muito cascalhenta Ambos A moderado, Cerrado e relevo suave ondulado	103,3	0,00%
PAd5	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média muito cascalhenta/argilosa muito cascalhenta Ambos A moderado, Cerrado, Floresta Equatorial subperenifólia e Floresta de transição e relevo suave ondulado	104.242,6	2,52%
PAd6	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média A moderado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico textura arenosa A fraco ambos Cerrado e Floresta Equatorial subperenifólia e relevo plano	2.806,6	0,07%
PAd7	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média A moderado, relevo plano e suave ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico textura arenosa A fraco, relevo plano ambos Cerrado	38.529,9	0,93%
PAd8	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média e textura média/argilosa relevo suave ondulado + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média relevo suave ondulado e plano ambos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado	51.127,1	1,23%
PAd9	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa pouco cascalhento/média pouco cascalhento relevo plano + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura argilosa pouco cascalhento A moderado relevo suave ondulado ambos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado	12.281,9	0,30%
PAd10	ARGISSOLO AMARELO Distrófico plíntico A moderado relevo plano e suave ondulado + LATOSSOLO AMARELO Distrófico plíntico A moderado relevo plano ambos textura argilosa e A moderado + PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura média pouco cascalhenta A fraco relevo ondulado e todos Floresta equatorial subperenifólia	159.241,2	3,85%
PAd11	ARGISSOLO AMARELO Distrófico plíntico textura arenosa/média + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média e textura média/argilosa ambos A moderado + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico arênico textura arenosa/média todos A moderado, Cerrado e Floresta Equatorial subperenifólia e relevo plano e suave ondulado	14.269,4	0,35%
PAd12	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura argilosa/muito argilosa + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média e média pouco cascalhento/argilosa pouco cascalhento ambos relevo suave ondulado + LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura média relevo plano e todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado	11.304,3	0,27%
PAd13	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa relevo plano + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média cascalhenta/argilosa muito cascalhenta relevo suave ondulado + ARGISSOLO AMARELO Distrófico plíntico textura argilosa/muito argilosa relevo plano todos A moderado e Cerrado	12.989,3	0,31%
PAd15	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média muito cascalhenta/argilosa muito cascalhenta relevo suave ondulado e ondulado + LATOSSOLO AMARELO Distrófico argissólico textura média/argilosa relevo plano e suave ondulado + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico arenosa pouco cascalhenta/média cascalhenta relevo plano todos A moderado e Cerrado e Floresta Equatorial subperenifólia	14.316,1	0,35%
PAd16	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média A moderado relevo suave ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico textura arenosa A moderado relevo plano + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico média muito cascalhenta/argilosa muito cascalhenta A moderado relevo suave ondulado todos Cerrado	2.387,5	0,06%
PAd17	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média e média/argilosa relevo ondulado + ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico textura argilosa cascalhenta/muito argilosa cascalhenta relevo suave ondulado + LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura argilosa relevo plano todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	71.737,2	1,73%
	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO	**765.778,5**	**18,49%**
	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico	764.107,6	18,45%
PVAd1	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa/muito argilosa A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo forte ondulado	4.195,9	0,10%
PVAd2	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média pouco cascalhenta/argilosa pouco cascalhenta e arenosa pouco cascalhenta/média pouco cascalhenta A moderado Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano	36.341,5	0,88%
PVAd3	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico petroplíntico textura argilosa muito cascalhenta/argilosa pouco cascalhenta Ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo suave ondulado	31.513,1	0,76%
PVAd4	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa relevo suave ondulado e ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura indiscriminada relevo ondulado + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário típico indiscriminado muito cascalhento relevo suave ondulado e ondulado todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	109.069,6	2,63%
PVAd5	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa cascalhenta + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico petroplíntico textura argilosa/argilosa muito cascalhenta ambos A moderado . Floresta equatorial subperenifólia e forte ondulado	22.454,4	0,54%
PVAd6	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico argilosa ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo forte ondulado e montanhoso	5.027,8	0,12%
PVAd7	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa muito cascalhenta + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico textura indiscriminada ambos A moderado . Floresta equatorial subperenifólia e relevo forte ondulado	1.795,0	0,04%
PVAd8	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média pouco cascalhenta/argilosa pouco cascalhenta + ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico médio pouco cascalhenta/argilosa pouco cascalhenta ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo suave ondulado	23.469,4	0,57%
PVAd9	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média pouco cascalhenta e média pouco cascalhenta/argilosa cascalhenta + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico indiscriminado ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo suave ondulado e ondulado	45.297,2	1,09%
PVAd10	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta + NITOSSOLO VERMELHO Distrófico argissólico textura média/argilosa ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo suave ondulado	20.348,8	0,50%
PVAd11	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico petroplíntico textura argilosa/argilosa muito cascalhenta ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo ondulado	13.254,5	0,32%
PVAd12	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico plíntico e típico textura arenosa/média relevo plano + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico média/argilosa + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa muito cascalhenta/média muito cascalhenta ambos relevo plano e suave ondulado e todos A moderado e Cerrado	29.692,8	0,72%
PVAd13	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta ambos suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico plíntico média relevo plano e todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	614,3	0,01%
PVAd14	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa + NITOSSOLO VERMELHO Eutrófico típico argilosa ambos relevo suave ondulado e ondulado + LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico textura argilosa relevo ondulado e forte ondulado e todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	9.862,1	0,24%
PVAd15	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa/muito argilosa e argilosa + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário argissólico textura média todos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo suave ondulado	28.697,8	0,69%
PVAd16	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa A moderado relevo suave ondulado e ondulado + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média pouco cascalhenta A fraco + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média pouco cascalhenta A moderado ambos relevo suave ondulado e todos Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado	54.064,6	1,31%
PVAd17	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico relevo suave ondulado e ondulado + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico ambos textura média/argilosa + NITOSSOLO VERMELHO Eutróférrico típico textura argilosa ambos relevo suave ondulado e todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado	71.835,6	1,74%
PVAd18	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico relevo plano e suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico ambos textura média + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário típico textura indiscriminada muito cascalhenta ambos relevo suave ondulado e todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	10.087,5	0,24%
PVAd19	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico média pouco cascalhenta/argilosa cascalhenta A moderado suave ondulado e ondulado + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico média cascalhenta/argilosa A moderado pedregosa I ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico indiscriminado A moderado pedregosa I suave ondulado e e Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado	4.730,6	0,11%
PVAd20	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta e argilosa + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico argilosa cascalhenta ambos relevo suave ondulado e ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico médio relevo suave ondulado e todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	7.946,3	0,19%
PVAd21	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa muito cascalhenta + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário argissólico textura argilosa muito cascalhenta + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típicoestura média e argilosa todos plano e suave ondulado + ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Hidro-hiperespesso espessarênico textura arenosa relevo plano todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	55.182,8	1,33%
PVAd22	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média pouco cascalhenta/média pouco cascalhenta/argilosa cascalhenta + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura indiscriminada ambos relevo suave ondulado e ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média e argilosa relevo plano e suave ondulado + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário argissólico textura argilosa muito cascalhenta/muito argilosa muito cascalhenta relevo suave ondulado e todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	14.337,7	0,35%
PVAd23	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico relevo plano e suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico suave ondulado ambos textura média + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário típico textura indiscriminada muito cascalhenta ambos relevo suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico textura argilosa relevo suave ondulado e ondulado e todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	131.380,0	3,17%
PVAd24	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa/muito argilosa + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário argissólico argilosa muito cascalhenta/muito argilosa muito cascalhenta Ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e Floresta de transição e relevo suave ondulado	32.731,5	0,79%
	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico	1.670,9	0,04%
PVAe	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico textura média/argilosa A moderado. Floresta equatorial subperenifólia e relevo suave ondulado	1.670,9	0,04%
	ESPODOSSOLO	**161.897,8**	**3,91%**
	ESPODOSSOLO FERRIHUMILÚVICO	**26.263,5**	**0,63%**
	ESPODOSSOLO FERRIHUMILÚVICO Hidromórfico	26.263,5	0,63%
ESKg1	ESPODOSSOLO FERRIHUMILÚVICO Hidromórfico órbico relevo plano e suave ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico relevo plano ambos textura arenosa A moderado e Campinarana equatorial arbustiva e campestre	520,8	0,01%
ESKg2	ESPODOSSOLO FERRIHUMILÚVICO Hidromórfico órbico textura arenosa + GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico + NITOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico ambos textura argilosa e todos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano	14.076,8	0,34%
ESKg3	ESPODOSSOLO FERRIHUMILÚVICO Hidromórfico órbico textura arenosa pouco cascalhenta arenosa + PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico típico textura média + PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura indiscriminada todos A moderado, Campinarana equatorial arbustiva e campestre e relevo plano	11.647,9	0,28%
	ESPODOSSOLO HUMILÚVICO	**135.634,2**	**3,28%**
	ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Hidro-hiperespesso	135.634,2	3,28%
Ekgp	ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Hidro-hiperespesso espessarênico textura arenosa + GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico argilosa Ambos A moderado + ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico típico argilosa A hórtico todos Campinarana equatorial arbustiva e campestre e relevo plano	135.634,2	3,28%
	GLEISSOLO	**112.065,3**	**2,71%**
	GLEISSOLO HÁPLICO	**112.065,3**	**2,71%**
	GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico	112.065,3	2,71%
GXbd1	GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico a plíntico TEXTURA indiscriminado + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico ambos textura indiscriminada, A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano	17.576,1	0,42%
GXbd2	GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico textura argilosa A proeminente + GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico solódico textura muito argilosa A moderado + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico solódico típico textura argilosa ambos A moderado e todos Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano	7.717,9	0,19%
GXbd3	GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico textura argilosa + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico textura indiscriminada + PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico solódico textura argilosa todos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano	17.925,6	0,43%
GXbd4	GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico ambos textura indiscriminada + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico textura arenosa todos A moderado, Cerrado, Floresta Equatorial subperenifólia e Floresta de transição e relevo plano	68.845,7	1,66%
	LATOSSOLO	**1.729.527,6**	**41,62%**
	LATOSSOLO AMARELO	**917.992,8**	**22,17%**
	LATOSSOLO AMARELO Distrófico	917.992,8	22,17%
LAd1	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura média A moderado, Cerrado e relevo plano	217.087,6	5,12%
LAd2	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico média e argilosa A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano e suave ondulado	65.480,2	1,58%
LAd3	LATOSSOLO AMARELO Distrófico argissólico textura argilosa A moderado relevo plano e suave ondulado + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa ambos A moderado, Cerrado e Floresta Equatorial subperenifólia e relevo plano e suave ondulado	1.931,6	0,05%
LAd4	LATOSSOLO AMARELO Distrófico argissólico textura média + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico arenosa ambos A fraco, Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano	9.747,0	0,24%
LAd5	LATOSSOLO AMARELO Distrófico plíntico textura argilosa relevo plano e suave ondulado + PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico indiscriminado relevo plano ambos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	31.863,9	0,77%
LAd6	LATOSSOLO AMARELO Distrófico plíntico textura argilosa relevo suave ondulado + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário típico textura indiscriminada muito cascalhenta relevo plano ambos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	13.994,0	0,34%
LAd7	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura argilosa + PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura indiscriminada ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano	11.908,3	0,29%
LAd8	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura argilosa e argilosa pouco cascalhenta + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média ambos A moderado, Cerrado e relevo plano e suave ondulado	12.497,5	0,30%
LAd9	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura argilosa e argilosa cascalhenta relevo plano e suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média relevo plano ambos A moderado e Cerrado	2.366,3	0,06%
LAd10	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura argilosa e média + PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura indiscriminada ambos A moderado campinarana equatorial arbustiva e campestre relevo	7.501,5	0,18%
LAd11	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura argilosa muito cascalhenta e argilosa + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média/muito argilosa ambos A moderado, Cerrado e relevo suave ondulado	2.716,9	0,07%
LAd12	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura média + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico arenosa ambos A moderado, Cerrado e Floresta Equatorial subperenifólia e relevo plano	98.479,9	2,38%
LAd13	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura média relevo plano e suave ondulado + ESPODOSSOLO FERRIHUMILÚVICO Órtico arênico textura arenosa relevo plano ambos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado	9.106,3	0,22%
LAd14	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura média muito argilosa + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico ambos textura muito argilosa + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário argissólico textura média muito cascalhenta todos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo plano e suave ondulado	66.234,3	1,60%
LAd15	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura argilosa relevo suave ondulado + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média ambos A moderado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico textura arenosa A fraco ambos relevo plano e todos Floresta equatorial subperenifólia	76.253,7	1,84%
LAd16	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura argilosa e média relevo plano e suave ondulado + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa relevo suave ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico textura arenosa relevo plano todos A moderado e Cerrado	56.990,7	1,38%
LAd17	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura média + ARGISSOLO ACINZENTADO Distrófico típico textura arenosa/média + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico textura arenosa todos A moderado, cerrado e relevo plano	88.596,6	2,14%
LAd18	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico média relevo plano + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa + ARGISSOLO AMARELO Distrófico plíntico textura média e arenosa/média ambos relevo plano e suave ondulado todos A moderado e cerrado	70.562,6	1,70%
LAd19	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico ambos textura média + PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura indiscriminada todos A moderado, Cerrado e Floresta Equatorial Subperenifólia e relevo plano	2.423,4	0,06%
LAd20	LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico textura média relevo plano e suave ondulado + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura arenosa/média e média/argilosa ambos relevo suave ondulado e todos A moderado e Cerrado. Floresta Equatorial subperenifólia e Floresta de transição	77.331,0	1,87%
	LATOSSOLO VERMELHO	**116.585,9**	**2,82%**
	LATOSSOLO VERMELHO Distrófico	102.797,3	2,48%
LVd1	LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico textura argilosa A moderado, e Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo suave ondulado e ondulado	99.113,8	2,39%
LVd2	LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico ambos textura argilosa + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário latossólico textura média muito cascalhenta/argilosa muito cascalhenta todos A moderado, Cerrado e Floresta Equatorial subperenifólia e relevo suave ondulado	1.119,1	0,03%
LVd3	LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico textura argilosa e argilosa cascalhenta relevo suave ondulado e ondulado + LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico típico textura média relevo suave ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico textura argilosa relevo forte ondulado todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado	2.564,4	0,06%
	LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico	13.788,5	0,33%
LVe1	LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico típico textura argilosa muito cascalhenta + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário latossólico ambos textura argilosa muito cascalhenta A moderado, Floresta Equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo suave ondulado	3.871,8	0,09%
LVe2	LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico típico relevo suave ondulado + NITOSSOLO VERMELHO Distrófico típico relevo suave ondulado e ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico relevo forte ondulado todos textura argilosa A moderado e Cerrado e Floresta de transição	9.916,7	0,24%
	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO	**688.948,9**	**16,64%**
	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO distrófico	688.948,9	16,64%
LVAd1	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média/argilosa ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo suave ondulado	26.535,8	0,64%
LVAd2	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário latossólico textura argilosa muito cascalhenta ambos A moderado, Cerrado e relevo suave ondulado	5.543,7	0,13%
LVAd3	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa cascalhenta relevo suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico petroplíntico textura argilosa pouco cascalhenta/argilosa muito cascalhenta relevo ondulado ambos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	198.141,0	4,78%
LVAd4	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico petroplíntico textura argilosa pouco cascalhenta/argilosa muito cascalhenta + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico petroplíntico textura argilosa pouco cascalhenta/argilosa muito cascalhenta ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e relevo suave ondulado	139.890,3	3,38%
LVAd5	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico petroplíntico textura argilosa pouco cascalhenta/argilosa muito cascalhenta + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura indiscriminada muito cascalhenta ambos relevo suave ondulado + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário típico textura indiscriminada muito cascalhenta relevo plano e todos A moderado e Floresta equatorial subperenifólia	23.445,8	0,57%
LVAd6	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico muito argilosa cascalhenta A moderado plano e suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico argilosa A moderado suave ondulado + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário latossólico média muito cascalhenta A moderado suave ondulado	36.976,1	0,89%
LVAd7	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico ambos textura argilosa + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário latossólico textura indiscriminada muito cascalhenta todos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo suave ondulado	68.633,7	1,66%
LVAd8	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário latossólico textura argilosa muito cascalhenta todos A moderado, cerrado e relevo suave ondulado	137,8	0,00%
LVAd9	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário latossólica textura indiscriminada muito cascalhenta + PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura indiscriminada todos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo suave ondulado	44.726,5	1,08%
LVAd10	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média e argilosa + LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico textura média + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário latossólico textura média muito cascalhenta todos A moderado, Cerrado e relevo plano e suave ondulado	14.184,3	0,34%
LVAd11	LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura média e argilosa + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário latossólico textura média muito cascalhenta/argilosa muito cascalhenta ambos A moderado relevo plano e suave ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico textura arenosa A fraco relevo plano todos Cerrado e Floresta Equatorial subperenifólia	130.730,9	3,16%
	NEOSSOLO	**521.676,1**	**12,60%**
	NEOSSOLO FLÚVICO	**992,4**	**0,02%**
	NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico	992,4	0,02%
RYbd1	NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico textura argilosa A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo plano	505,9	0,01%
RYbd2	NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico textura média + GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico indiscriminado ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo plano + AFLORAMENTOS DE ROCHAS	486,6	0,01%
	NEOSSOLO LITÓLICO	**318.099,4**	**7,68%**
	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico	318.099,4	7,68%
RLd1	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura média A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo forte ondulado e montanhoso + AFLORAMENTOS DE ROCHAS	40,2	0,00%
RLd2	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura média cascalhenta e arenosa + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura média ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo suave ondulado	5.640,7	0,14%
RLd3	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura indiscriminada + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico textura argilosa ambos A moderado, Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado relevo forte ondulado	12.493,5	0,30%
RLd4	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura indiscriminada A moderado Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo forte ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHAS	10.456,7	0,25%
RLd5	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura indiscriminada A moderado Floresta equatorial subperenifólia e relevo forte ondulado e montanhoso + AFLORAMENTOS DE ROCHAS	51,8	0,00%
RLd6	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura indiscriminada muito cascalhenta A fraco e A moderado Floresta equatorial subperenifólia e relevo forte ondulado e montanhoso + AFLORAMENTOS DE ROCHAS	35.823,7	0,87%
RLd7	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura indiscriminada muito cascalhenta A fraco e A moderado Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo forte ondulado e montanhoso + AFLORAMENTOS DE ROCHAS	228.474,2	5,52%
RLd8	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura argilosa muito cascalhenta A fraco e A moderado + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico média/argilosa e argilosa A moderado ambos Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo forte ondulado e montanhoso + AFLORAMENTOS DE ROCHAS	14.046,2	0,34%
RLd9	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura indiscriminada A moderado e A fraco relevo montanhoso e escarpado + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico argilosa A moderado relevo montanhoso ambos Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado + AFLORAMENTOS DE ROCHAS	7.634,0	0,18%
RLd10	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura indiscriminada A fraco relevo suave ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHAS + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico textura média A moderado relevo planoambos Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado	3.413,5	0,08%
	NEOSSOLO QUARTZARÊNICO	**202.584,3**	**4,89%**
	NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico	103.412,7	2,50%
RQg1	NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico + ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Hidro-hiperespesso espessarênico ambos textura arenosa A moderado Floresta equatorial subperenifólia e Cerrado e relevo plano	62.131,8	1,50%
RQg2	NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico + ESPODOSSOLO FERRIHUMILÚVICO Hidromórf